

الجدول رقم 1
الرصاص ومركباته

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
(أ) المظاهر الحادة وشبه الحادة:		
- فقر دم مثبت بتحليل دموي.	90 يوما	استخراج ومعالجة وتحضير واستعمال ومباشرة الرصاص ومعادنه ومركباته وكل مادة تحتوي على الرصاص خاصة: - لحام ممزوجات الرصاص وقصودرتها، - كشط وحرق وقطع بالحملاج لمواد مغلقة بدهن رصاصي، - تحضير واستعمال دهن أو لقاغ أو لك أو صنغ أو عجين دهني مطواع يدخل الرصاص في قاعدة تركيبته، - أعمال الطباعة، - استرداد الرصاص المستعمل، - تحضير ومباشرة مركبات رباعي إيتيل ورباعي ميثيل الرصاص خاصة في تنظيف خزانات الوقود المحتوي على المواد المذكورة.
- متلازمة نوبات ألم حاد بالبطن بدون حمى مع حالة شبه انسداد القولون (زحال الرصاص) يكون مصحوبا عادة بأزمة ارتفاع ضغط الدم. - اعتلال دماغي حاد.	30 يوما	
في كل المظاهر الحادة وشبه الحادة يكون التعرض للرصاص ظاهرا بتركيز يفوق 40 ميكروغرام رصاص/100 مل من الدم والعلامات السريرية المصاحبة لوجود حامض دلتا أمينليفولينيك في البول بنسبة أكثر من 15 مغ/غرام كرياتينين أو بنسبة بروتوبورفيرين في كريات الدم الحمراء تفوق 20 ميكروغرام/غرام من الخضاب الدموي (الهيموجلوبين) ويفقر دم بنسبة عادية أو مرتفعة من الفرتين.		
(ب) المظاهر المزمنة:		
- اعتلالات عصبية طرفية و/ أو متلازمة التصلب الجانبي مع الضمور العضلي الذي لا يحدث بعد التوقف عن التعرض لأسبابه.	3 سنوات	
- اضطرابات عصبية: كشوه وظائف الإدراك الثابتة عضويا وذلك بعد استبعاد المظاهر المزمنة للمرض الكحولي وبطرق موضوعية.	سنة واحدة	
- العجز الكلوي المزمن.	10 سنوات	
لكل المظاهر المزمنة يجب أن يكون التعرض للرصاص متميزا بوجود سابق للرصاص في الدم بمقدار يفوق 50 ميكروغرام/100 مل من الدم، وفي غياب ذلك باضطرابات بيولوجية مرتبطة بتعرض سابق للرصاص.		
(ج) متلازمة بيولوجية:		
- تشمل تشوهين: * إصابة بيولوجية تحتوي: إما نسبة من حامض دلتا أمينليفولينيك تفوق 15 مغ/غرام من كرياتينين البول، أو بنسبة من بروتوبورفيرين الزنك أو بروتوبورفيرين في كريات الدم الحمراء تفوق 20 ميكروغرام/غرام من الخضاب الدموي. * ومقدار رصاص يفوق 50 ميكروغرام/100 مل من الدم. يجب إثبات هذه المتلازمة البيولوجية بإجراء فحص ثاني بعد مدة تتراوح بين 3 أيام وشهرين على أقصى تقدير من قبل مخبر مرخص له أو معتمد.	30 يوما	