

الجدول رقم 59
العوامل الأخرى المسببة للجلاد الأرجي الإكزيمي الشكل

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي تسبب المرض
- الإصابات الأكزيمية الشكل المتكررة بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار إيجابي النتيجة على الجلد باستعمال المادة نفسها.	30 يوما	تحضير واستعمال ومباشرة العناصر المضرة المذكورة أسفله على سبيل الحصر. (أ) العناصر الكيماوية - الحامض الكلوربلاتيني - الكوربلاتينيات القلوية - البارسولفاتات القلوية - تيوغليكولات الأمونيوم - الإيبوكلوريتات القلوية - الأمونيومات الرباعية وأملاحها خاصة في المواد المنظفة الكاتيونية - دوديسيل- أمين أتيل الغليسرين - البيرازين - ماركابتو-بنزوتيازول - سلفور رباعي الميتيل تيورام - الحمض الماركبتوبربيوني ومشتقاته - ن - ايزوبروبيل، ن - فاينيل بارا فانيلان - ثاني الأمين ومشتقاته - ثاني تيو الكربامات - أملاح ثاني الأزونيوم خاصة كلوريد ثاني بنزيتوتيازولين 3 - أون، - مشتقات التيو يوريا - الأكريلاتات والميتاكريلاتات - الراتنجات المشتقة من بارا-تارت-بوبيلفينول ومن بارا-تارت-بوتيلكتاتكول - ثاني سيكلوهيكسيلكاربو ثاني الأميد (ب) المواد النباتية أو ذات الأصل النباتي: - مواد استخراج الصنوبر خاصة روح التربينتين وصمغ البطم ومشتقاته، - بلسم البيرو - الأوروشبول (لك الصين) - النباتات المحتوية على لكتونات سادس الترييني (خاصة الخرشوف- الأرنيك- الأقحوان- البابونج- الإكليل - السوسوريا- الفرولانبا- شجرة الزنبق شبيهة الشيح الدالية) زهرة الربيع - الخزامي، - الثوميات (الثوم والبصل خاصة)