

الجدول رقم : 59 العوامل الأخرى المسببة للجلاد الأرجي الإكزيمي الشكل

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - تحضير و استعمال و مباشرة العناصر المضرّة المذكورة أسفله على سبيل العصر ١١ العناصر الكهباوية ، - الحامض الكلوربلاتيني ، - الكلوربلاتينيات القلوية ، - البارسولفانات القلوية ، - تيو غليكولات الأمونيوم ، - الإيبيكلو ريدرين ، - الإيبوكلو ريتات القلوية ، - الأمونيومات الرباعية و أملاحها خاصة في المواد المحظفة الكاثيونية ، - دوديسيل - أمين أتيل الغليسرين ، - البيبارازين - ماركابتو-بنزوتيازول - سلفور رباعي الميتيل تيورام - الحمض الماركابتوبروبيوني و مشتقاته - ن - ايزوبروبيل ، ن - فاينيل بارا فانيلان - ثاني الأمين و مشتقاته - الهيدروكينون و مشتقاته ، - ثاني تيو الكريامات - أملاح ثاني الأزونيوم خاصة : كلوريد ثاني الاتيل أمينو بتزين ثاني الأزونيوم - بنزوتيازولين 3 - اون - مشتقات التيو يوريا ، - الأكريلاتات و الميتاكريلاتات ، - الراتنجات المشتقة من بارا- تارت- بوتيلفينول و من بارا- تارت- بوتيلكاتاكول ، - ثاني سيكلوهيكسيلكاربو ثاني الأميد ١٢ المواد النباتية أو ذات الأصل النباتي ، - مواد استخراج الصنوبر خاصة روح التربينتين و صمغ البطم و مشتقاته ، - بلسم البيرو - الأوروشبول (لك الصين) ، - النباتات المحتوية على لكتونات سادس الترييني (خاصة الخرشوف - الأرنیکا - الأحقوان - البابونج - الإكليل السوسوريّا - الفرولانیا - شجرة الزنبق - شيبة الشيح الدالية) رهرة الربيع - الخزامى - الثوميات (الثوم و البصل خاصة) 	<p>30 يوما</p>	<p>- الإصابات الأكزيمية الشكل المتكررة بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار ايجابي النتيجة على الجلد باستعمال المادة نفسها</p>