

الجدول عدد 40

المذيبات العضوية الأخرى السائلة ذات الإستعمال المهني

الهيدروكاربونات السائلة الأليفاتية والأليسكلية والأيتيروسكلية والعطرية وأخلاطها (وايت سيريت - البنزينيات الخاصة) والمشتقات النترية من الهيدروكاربونات الأليفاتية والأسيتونتريل والكحول والألديهيدات والسيتونات والأسترات والأثيرات بما فيها رابع الهيدوفوران والغليكولات وأثيراتها وثاني ميثيل الفورماميد وثاني ميثيل السلفوكسيد والبيريدين وثاني ميثيل السلفون

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
متلازمة انشمال أو تخدر يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة.	3 أيام	- تحضير واستعمال ومباشرة المذيبات.
التهاب الجلد التهيجي مع تجفف الجلد المتكرر بعد التعرض من جديد للمذيب.	7 أيام	- معالجة الراتنجات الطبيعية أو الاصطناعية.
الإصابات الجلدية الإكزيمية الشكل المتكررة بعد تعرض جديد للمذيب أو مثبت باختبار إيجابي على الجلد باستعمال المواد المسببة ذاتها.	15 يوما	- استعمال الملمعات والأدهان والطلاء والغراء والعجين الدهني المطواع واللاك
متلازمة الاعتلال الدماغي المتميزة بوجود اختلالات في ثلاثة وظائف على الأقل من بين وظائف الإدراك الستة وهي تباطؤ الحركة، اضطراب البراعة اليدوية، اضطراب الذاكرة، اضطراب تنظيم النظر في الفضاء، اضطراب وظائف التنفيذ ونقص في الانتباه. ويقع تشخيصه من خلال اختبارات نفسية قياسية ملائمة للاختلالات المسجلة تتم بعد شهر على الأقل دون التعرض للخطر.	سنة واحدة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	- إنتاج المطاط الطبيعي والاصطناعي.
		- استعمال المذيبات كعناصر استخراج وتشريب وتكتل وتنظيف وكمقشرات ومذوبات ومخففات.
		- استعمال المذيبات كمفاعلات مخبرية في الإنشاءات العضوية وفي الصيدلة وفي مواد التجميل.