

مهني الصحة يتصل بطبيب الشغل أو بالطبيب المرجعي كوفيد 19 الذي يقيم إمكانية العدوى ويقرر ما سيتعين عنه

مواصلة العمل مع احترام الإجراءات الوقائية (التنفسية وعن طريق اللمس)

القيام بتحليل RT-PCR بين اليوم الرابع والسابع من التعرض لمريض كوفيد 19

(إذا ظهرت العلامات المرضية على مهنيي الصحة قبل اليوم الرابع ← يجرى له تحليل RT-PCR)

### RT-PCR ايجابية

-العزل بالمنزل او في مركز إيواء أو بالمستشفى حسب المعطيات السريرية لمدة 10 ايام بعد تاريخ التحليل الأول و على الأقل 72 ساعة بعد اختفاء الأعراض.

-تقصي المخالطين اللصيقين (contact tracing) من طرف طبيب الشغل أو الطبيب المرجعي كوفيد 19 إن وجد بالهيكل الصحي ومن طرف الإدارة الجهوية للصحة بالنسبة للعائلة.

-العودة للعمل حسب المعطيات المشار إليها أعلاه (الحصول على شهادة طبية تثبت الشفاء) مع احترام وسائل الوقاية التنفسية وعن طريق اللمس .

-ارتداء القناع باستمرار في المنزل مدة 14 يوما بعد العودة للعمل.

### RT-PCR سلبية

(ب) وجود الأعراض :

-العزل في المنزل مدة 7 أيام من تاريخ بداية الأعراض (التوقف عن العمل يقرره طبيب الشغل أو الطبيب المرجعي كوفيد 19)

- يتكفل الطبيب المعالج بمتابعة حالة المريض.

- وتكون العودة للعمل 72 ساعة بعد انتهاء الأعراض.

ملاحظة:

ارتداء الكمامة إجباري في كل الحالات عند مباشرة المريض أو مخالطة الزملاء في العمل مهما كانت الحالة الصحية لمهنيي الصحة مريض حامل للأعراض أو غير حامل للأعراض .

(أ) غياب الأعراض :

•مواصلة العمل مع احترام وسائل الوقاية (التنفسية وعن طريق اللمس).

•ارتداء القناع باستمرار في مكان العمل والمنزل .

•متابعة المراقبة الذاتية مدة 14 يوما من التعرض لمريض كوفيد 19 .

•إذا ظهرت الأعراض يتصل بالطبيب المرجعي كوفيد 19 وإعادة تحليل RT-PCR.

RT-PCR سلبية متابعة  
النشاط المهني مع تطبيق  
إجراءات الوقاية

RT-PCR ايجابية