

الملحق : رزنامة عيادات مراقبة الحمل العادي ومحتواها

ملاحظات	محتواها	الإطار المكلف	مواعيدها	العيادة
<p>وخلال كل هذه العيادات يتعين :</p> <p>1. تأمين التثقيف الصحي والتوعية حول :</p> <p>- عدم استهلاك أي دواء دون استشارة الطبيب،</p> <p>- ضرورة الولادة بمؤسسة صحية</p> <p>- أهمية الرضاعة الطبيعية</p> <p>- كيفية العناية بالوليد في المنزل</p> <p>- جلب والاستظهار بالدفتر الصحي في كل عيادة.</p>	<p>1. فحص سريري شامل (طبقا لدليل مراقبة الحمل) + كشف الألبومين في البول بالشريط الكاشف</p> <p>2. فحوص تكميلية آلية :</p> <p>- تحديد فصيلة الدم (Groupe Sanguin + Rhésus)</p> <p>- نقصي مرض السكري لدى الحوامل.</p> <p>- نقصي مرض فقر الدم (Numération formule sanguine)</p> <p>- نقصي داء الزهري (Syphilis)</p> <p>- كشف بالصدى</p> <p>- نقصي آلي لفيروس فقدان المناعة المكتسب بالشريط الكاشف (علما وأن المرأة الحامل يمكنها رفض هذا الكشف)</p> <p>3. فحوصات تكميلية منصوص بها :</p> <p>- نقصي داء المقوسات الخلقي والحميراء (Toxoplasmose et Rubéole)</p> <p>للنساء اللاتي لا توجد لديهن نتائج مكتوبة وواضحة عن وجود مناعة ضد هذه الأمراض</p> <p>- نقصي فيروس التهاب الكبد ب و ج</p> <p>4. الأدوية الآلية : حبوب مادة الحديد والحامض الفوليكي طبقا للبروتوكول العلاجي</p> <p>5. خدمات أخرى :</p> <p>- مراجعة رزنامة تلقح الأم وإكمالها إن لزم الأمر</p> <p>- تعميم الدفتر الصحي وتسليمه للمرأة الحامل</p>	القابلة	قبل إنتهاء الثلاثي الأول	العيادة الأولى

<p>2. القيام بعيادات أو فحوصات إضافية إذا استوجبت حالة المرأة الحامل ذلك وفقا لما يراه الطبيب أو القابلة.</p>	<p>- الفحص الطبّي الشّامل للمرأة الحامل وتقصّي عوامل الإختطار الخاصة بالأمّ والجنين والتثبّت من نتائج التحاليل والفحوصات المطلوبة آنفاً، - تكميل الدّقتر الصّحي</p>	<p>طبيب</p>	<p>الشّهر الرّابع</p>	<p>العيادة الثّانية</p>
<p>يتمّ التقصي الآلي لفيروس فقدان المناعة المكتسب بالشريط الكاشف في أول عيادة مراقبة الحمل مهما تكون مدة الحمل وإعادته 3 أشهر ما بعد.</p>	<p>- فحص سريري شامل - التأكّد من سلامة التحاليل المخبرية - البحث عن عوامل الإختطار : السكري ارتفاع ضغط الدم، إمكانية حدوث ولادة سابقة لأوانها...، تقصّي التعفّن البولي بصفة آليّة - الكشف الثّاني بالصدى</p>	<p>القابلة</p>	<p>الشّهر السادس</p>	<p>العيادة الثّالثة</p>
<p>يتمّ التقصي الآلي لفيروس فقدان المناعة المكتسب بالشريط الكاشف في أول عيادة مراقبة الحمل مهما تكون مدة الحمل وإعادته 3 أشهر ما بعد.</p>	<p>- مراقبة نموّ الجنين والتأكّد من سلامة التّحاليل المخبريّة ، مع مواصلة البحث عن الأخطار التي يمكن أن تحدث ابتداء من الشّهر السّادس (السكري، ارتفاع ضغط الدّم ، إمكانية حدوث ولادة سابقة لأوانها... ) - الكشف الثّالث بالصدى</p>	<p>القابلة</p>	<p>الشّهر الثّامن</p>	<p>العيادة الرّابعة</p>
<p>يتمّ التقصي الآلي لفيروس فقدان المناعة المكتسب بالشريط الكاشف في أول عيادة مراقبة الحمل مهما تكون مدة الحمل وإعادته 3 أشهر ما بعد.</p>	<p>- فحص سريري شامل مع مواصلة البحث عن الأخطار التي يمكن أن تحدث - تحديد مكان الولادة حيث يتمّ توجيه المرأة إلى قسم التّوليد المناسب لحالتها وحالة جنينها مصحوبة برسالة التوجيه للوضع.</p>	<p>القابلة</p>	<p>الشّهر التّاسع</p>	<p>العيادة الخامسة والأخيرة</p>

الإمضاء: محمد الصّالح بن عمار