

الملحق رقم (2)

الفحوصات التكميلية **EXAMENS COMPLEMENTAIRES**

1- الفحوصات الآلية **EXAMENS SYSTEMATIQUES** :

- تحديد فصيلة الدّم (*Groupe Sanguin Rhésus*)

- نقصّي داء الزّهري (*Syphilis*)

- نقصّي مرض السكّري من خلال :

• قياس نسبة السكّر في الشّعيرات (*Glycémie capillaire*)

• أو قياس نسبة السكّر في الدّم لدى المرأة الصائمة (*Glycémie à Jeun*)

• أو إختبار GP50 (تحليل نسبة السكّر في الدّم بعد تناول 50 غرام من الغلوكوز

" *Le tièrs d'un flacon de 500 cc de Sérum Glucosé à 30 %* "

• أو إختبار قابليّة الجسم لتحمل جرعات عالية نسبيا من الغلوكوز (*HGPO*)

وذلك حسب تواجد عوامل الإختطار لدى المرأة الحامل وحسب الإمكانيّات المتاحة
(أنظر التليل التكويني المحيّن حول مراقبة الحمل).

- نقصّي مرض فقر الدّم من خلال تعداد الكويرات والصّيغة الدمويّة
(*Numération formule sanguine*) بما في ذلك تعبير مادّة الهيموقلوبين.

- نقصّي التعفّن البولي بصفة آيّة لكافة النّساء الحوامل في الشّهر السادس والشّهر
التّاسع من الحمل وذلك بواسطة الكشوفات الخاصّة (*Multistix*)، وإتباعه بتحليل
مخبري إن لزم الأمر.

2- الفحوصات الموصى بها حسب الوضعيات والإمكانيات EXAMENS RECOMMANDES :

- نقصي داء المقوسات الولادي والحميراء (*Toxoplasmosis et Rubéole*) للنساء اللاتي لا توجد لديهن نتائج مكتوبة وواضحة عن وجود مناعة ضد هذه الأمراض.
- الكشف بالصدى وذلك بإجراء كشف واحد على الأقل يتم خلال الثلاثي الثاني (20-24 أسبوع من الحمل).

ملاحظة :

تجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان القيام بعيادات أو فحوصات إضافية إذا استوجبت حالة المرأة الحامل ذلك وفقا لما يراه الطبيب أو القابلة.