


Vaccins à reconstituer avant utilisation, Ces vaccins (ex: BCG, vaccin anti-rougeoleux, ...), ne sont pas concernés par la stratégie de réutilisation des flacons entamés.



Jeter tous les flacons ouverts à la fin de la séance ou après 6 heures.

Vaccins liquides : les flacons entamés des vaccins liquides suivants: DTC, VPO, d.T, VAT., peuvent être réutilisés dans les 15 jours qui suivent leur ouverture à condition de respecter les règles suivantes:

- La date de péremption du flacon de vaccin n'est pas dépassée.
- Les vaccins sont conservés dans les conditions appropriés de la chaîne de froid.
- Les flacons de vaccins n'ont pas été immergés dans l'eau.
- La PCV (si elle existe) n'a pas atteint le point limite d'utilisation.
- Les techniques d'asepsies ont été respectées lors du prélèvement de chaque dose.

Les règles d'asepsie doivent être respectées pour tous les vaccins et avec plus de rigueur pour les flacons entamés. Ci-contre 2 règles essentielles d'asepsie. Pour plus de détail, voir le manuel du PNV.

⚡ Ne toucher à aucune partie de l'aiguille. Ne pas utiliser une aiguille qui a été en contact avec une surface non stérile.



⚡ Ne jamais laisser l'aiguille dans le bouchon du flacon de vaccin durant la séance vaccinale.

