

الملحق عدد 3 : مواصفات مراقبة الحصص عند الختم

الحد الأقصى المسموح (النسبة المئوية) في الوزن				العدد الرتبى	العيوب و الطفيليات
B	A	E	S.E		
0,5	0,5	0,5	0	1	ترايب و أجسام داخيلة
2	1	0,5	0	2	تشوه فيزيولوجي و جروح
0,5*	0,1*	0	0	3	تعفن رطب و ميلديو
2	0,5	0,1	0	4	تعفن جاف
5	5	0	0	5	درنات مصابة بفرشة السوس و الديدان السلكية و الديدان و البصاق
15	10	5	0	6	ريزكتونيا سولني إصابة خفيفة
10	10	5	0	7	عفصة (قال) مشتركة و عفصة (قال) فنية
٪ 6	٪ 4	٪ 1	0		الحد الأقصى المسموح به من 1 إلى

ملاحظة :

- * يجب أن لا يتجاوز الحد المسموح به من " فيتوكتورا أنفستانس " درنة عن كل كيس بالنسبة للدرجات " A " و " B " .
- * يجب أن لا تحتوي الحصص على نسبة من البراعم تفوق 10 ٪ من الدرناات .

مواصفات المراقبة اللاحقة بالنسبة المائوية حسب عدد الشتلات المراقبة

B	A	E	S.E	الدرجة
% 5	% 4	% 1	% 0,5	مجموع الفيروسات (PLRV, PVY, PVA, PVX, PVS)
% 5	% 2	0	0	العيوب الفيزيولوجية (براعم شمعية)