

ملحق عدد 2
المواصفات والنسب المسموح بها في حصص البذور

النوع / مواصفات المواصفات	الفصنة		البرسم		السلة						الفصنة			
	سلة التتمال		سلة سوسنة		سلة سوسنة		سلة التتمال		سلة سوسنة		سلة التتمال			
	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م		
التقاوة النورية	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
النظا (% وزن)	98	98	90	98	90	95	90	95	90	95	90	95	90	98
بذور نباتات اخرى	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
(% وزن)	1	1	6	1	1	1	6	1	1	1	6	1	1	1
النسبة القسوى من بذور نباتات طفيلية	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
(% وزن)	0.5	0.5	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
النسبة القسوى من الشوائب والدور المخزورة (% وزن)	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
(% وزن)	3	0.5	3	0.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.5
النسبة القسوى من القشرة الابائية	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
للانديا المسموح بها	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
النسبة القسوى من الحبوب الصالحة	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
(% وزن)	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40
**حبات الكشو في الكغ	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
**حبات الورد في الكغ	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
**حبات جيفيل في الكغ	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
تواجد حبات الرسيم في العينة المحللة *	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
تواجد حبات الفصنة في العينة المحللة *	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
تواجد حبات الحموق في العينة المحللة *	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
تواجد حشرات حبة	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م	ب	م
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ملاحظات: * يحدد حجم العينة الحاصصة لتحليل التقاوة النورية حسب عدد الحبات و النسبة المئوية طبقا لقرارد المنظمة الدولية لتجاراب البذور
** لا يعتبر وجود حبة واحدة من الحامول أو الهالوك في عينة من الفصنة أو البرسم وزنها { 1 كغ } من الشوائب المسموحة في صورة عدم العثور على حبة اخرى ضمن العينة الثانية.
تكون محل رفض كل العينات التي تحتوي على أكثر من حبة واحدة من الحامول.