

الملحق 3 :

مواصفات تحاليل المحصص

البذور العادية	البذور مثبتة الصلوحية	البذور الأساسية	
٪97	٪98	٪99	النقاوة الخصوصية الدنيا
٪95	٪99,5	٪99,9	نقاوة الأصناف
٪0,5	٪0,3	٪0,1	النسب القصوى لوجود حبوب من الأجناس الأخرى
٪85	٪85	٪90	القدرة الانتابية الدنيا
0	0	0	كيسكيت في 50 غرام
0	0	0	أوريانش في 50 غرام
			النسبة القصوى للحبوب الصلبة التي يجب اعتبارها مثل حبوب قابلة الانتبات :
-	-	-	- الجلبانة
٪20	٪20	٪20	- الفول المصري
-	٪20	٪20	- الفول
-	-	-	- العدس
-	-	-	- الحمص
٪20	٪20	٪20	- الفاصوليا
٪3	٪2	٪1	النسبة القصوى للحبوب التي بها أثر تسوس
0	0	0	الحشرات الحية
٪12	٪12	٪12	الرطوبة
٪0,2	٪0,2	0	الأمراض الفيروسية
٪0,2	٪0,2	0	الأمراض البكتيرية*
٪2	٪2	0	أنتراكونوس
٪5	٪5	0	أمراض أخرى منقولة عبر البذور
0	0	0	ديتلنكيس ديشيسي نيماتود

ملاحظة خاصة : مجموع نسب الأمراض الفطرية يجب أن لا يتعدى 5 ٪

* غير مسموح لأي وجود للأمراض المحصورة :

(إكسانتومانوس كومبيستري ب - ف فايسولي و بسود ومرناس سيرينجي ب - ف بيس)