## الملحق 5 :مواصفات تحليل الحصص

| النجليات | المنجور | | | الفستوكة | | | الأصبعية | | | الزوان | | | النجيل | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المواصفات | بذور أساسية | بذور مثبتة الصلوحية | بذور عادية | بذور أساسية | بذور مثبتة الصلوحية | بذور عادية | بذور أساسية | بذور مثبتة الصلوحية | بذور عادية | بذور أساسية | بذور مثبتة الصلوحية | بذور عادية | بذور أساسية | بذور مثبتة الصلوحية | بذور عادية |
| القدرة الانباتية الدنيا | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| النقاوة النوعية الدنيا | 95 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 |
| العدد الأقصى للبذور من أنواع أخرى (الوزن٪) | 0,1 | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 6 |
| العدد الأقصى لبذور الأعشاب الطفيلية (الوزن٪) | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | | 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 5 |
| العدد الأقصى لأنواع أخرى في العينة | | | | | | | | | | | | | | | |
| . 1 نوع واحد | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| . ريكس | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| . أقروبيرون ريبنس | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| . ألوبيكريس ميوسورود | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| .لوسكيتا (س ب) أفينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |