

الجدول رقم 9  
البيريلىوم ومركباته

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
أ- المظاهر الموضوعية:		
- التهابات حادة بالملتحمة أو متكررة إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة. - التهاب الجلد التماسي التهيجي.	15 يوما	- الأعمال المعرضة للبيريلىوم ومركباته، خاصة سحق ومعالجة خامات البيريلىوم (البيريل)، - إنتاج وتصنيع البيريلىوم وأخلاطه وتركيباته، - صناعة واستعمال المساحيق المتكونة أساسا من أملاح البيريلىوم والمخصصة للطلي الداخلي للأنايب المتألقة.
- التهاب الجلد التماسي التحسسي المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت باختبار جلدي سطحي خاص إيجابي النتيجة للمادة المستعملة.	30 يوما	
ب- المظاهر العامة:		
- الالتهاب القصي الرئوي الحاد أو شبه الحاد المنتشر مع ظهور متأخر لعلامات مشخصة إشعاعيا تكون غالبا خفية.	30 يوما	
- تليف رئوي منتشر مع وجود علامات مشخصة إشعاعيا واضطرابات وظيفية وعلامات عامة (تحول ووهن) مثبتة باختبار وظيفي للجهاز التنفسي بما في ذلك المضاعفات القلبية (عجز البطين الأيمن) والمضاعفات الجنبوية الرئوية الثانوية (استرواح الصدر الحفوي).	25 سنة	