

**الجدول رقم 13**  
**أغبرة كربيدات المعادن الملبدة**  
**(التنغستان والموليبدان والنيوبيوم ومعادن أخرى صلبة)**

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض	
الأعمال المعرضة لاستنشاق أغبرة كربيدات المعادن الملبدة، خاصة: - صناعة كربيدات المعادن الملبدة: خلط المساحيق، العمل بالضغوطات والأفران، الأشغال المعملية قبل التليد والتعديل بعد التليد، - تحويل كربيدات المعادن الملبدة: صناعة أدوات ذات أطراف من كربيدات المعادن الملبدة أو قطع من كربيدات المعادن الملبدة. - شحذ أدوات أو قطع مصنوعة من كربيدات المعادن الملبدة، - نحت الألماس بواسطة اسطوانات تحتوي على معادن ملبدة، - أعمال أخرى تُنجز بمحلات: * تُصنع أو تُحوّل فيها كربيدات المعادن الملبدة. * تتم فيها صيانة الأدوات أو القطع المصنوعة من كربيدات المعادن الملبدة.	15 يوما	- الربو المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت باختبار وظيفي للجهاز التنفسي. - التهاب تشنجي بالأنف المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت باختبار. - متلازمة تهيج تنفسي من نوع سعال وضيق تنفس يتكرر بعد التعرض من جديد للمادة المستعملة.	
		سنة واحدة	- متلازمة تهيج تنفسي مزمن مثبتة باختبار وظيفي للجهاز التنفسي.
		5 سنوات	- تليف رئوي منتشر مع علامات مشخصة إشعاعيا واضطرابات وظيفية مثبتة باختبار وظيفي للجهاز التنفسي. - مضاعفات خمجية رئوية. - مضاعفات قلبية: عجز البطين الأيمن.