

الجدول رقم 14  
أغبرة وأدخنة أكسيد الحديد

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	قائمة الأعمال التي قد تسبب المرض
- السحار الحديدي (سيدروسيس) : التهاب رئوي خلالي مزمّن بسبب الحمل الزائد لجزيئات الحديد أو أكاسيد الحديد، يتم الكشف عنه من خلال عتامة نقطية منتشرة على صور الأشعة السينية أو التصوير المقطعي أو من خلال نتائج التشريح المرضي عند وجودها، وتكون هذه العلامات أو النتائج مصحوبة أو غير مصحوبة باضطرابات تنفسية وظيفية.	35 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 10 سنوات	القائمة البيانية لأهم الأعمال الأعمال المعرضة لاستنشاق أغبرة أو أدخنة محتوية على جزيئات الحديد أو أكسيد الحديد، خاصة: - استخراج وطحن وتفتيت ومعالجة خامات الحديد والصخر، - التلميع بمواد كاشطة تعتمد على أكسيد الحديد، - اللحام القوسي للفولاذ الطري.
- سرطان قصبي رئوي أولي.	30 سنة	القائمة الحصرية للأعمال - الأعمال المنجزة في مناجم الحديد.