

الجدول عدد 40

المذيبات العضوية الأخرى السائلة ذات الاستعمال المهني

الهيدروكربونات السائلة الأليفاتية والأليسيكلية والإينيروسكلية والعطرية وأحلاطها (وايت سبيريت - البنزينيات الخاصة) والمشتقات النترية من الهيدروكربونات الأليفاتية والأسيتونتريل والكحول والألدیهيدات والسيونونات والأسترات والأثيرات بما فيها رابع الهيدوفوران والجليكولات وأثيراتها وثاني ميثيل الفورماميد وثاني ميثيل السلفوكسيد والبيريدين وثاني ميثيل السلفون

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
- متلازمة انشمال أو تخدر يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة.	3 أيام	- تحضير واستعمال ومباشرة المذيبات، - معالجة الراتينجات الطبيعية والاصطناعية، - استعمال الملمعات والأدهان والطلاء والغراء والعجين الدهني المطواع والملاك، - إنتاج المطاط الطبيعي والاصطناعي، - استعمال المذيبات كعناصر استخراج وتشريب وتكتل وتنظيف وكمقشرات ومذيبات ومخففات، - استعمال المذيبات كمفاعلات مخبرية في الإنشاءات العضوية وفي الصيدلة وفي مواد التجميل.
- التهاب الجلد التماسي التهيجي المتكرر بعد التعرض من جديد للمذيب. - التهاب الجلد التماسي التحسسي، المتكرر إثر التعرض من جديد للمذيب أو المثبت باختبار جلدي سطحي خاص إيجابي النتيجة للمادة المستعملة.	15 يوما	
- التهاب الجلد التماسي التحسسي، المتكرر إثر التعرض من جديد للمذيب أو المثبت باختبار جلدي سطحي خاص إيجابي النتيجة للمادة المستعملة.	30 يوما	
- متلازمة الاعتلال الدماغي المتميزة بوجود ثلاثة اختلالات في وظائف الإدراك على الأقل من بين الاضطرابات الستة التالية: التباطؤ الحركي-النفسي، اضطراب البراعة اليدوية، اضطراب الذاكرة، اضطراب في العلاقة المكانية بين الأشياء والفضاء، اضطراب وظائف التنفيذ ونقص في الانتباه. ويقع تشخيصه باختبارات نفسية قياسية ملائمة للاختلالات المسجلة تتم بعد شهر على الأقل من التوقف عن التعرض للمادة المستعملة.	سنة واحدة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	
- تصلب الجلد الجهازى.	15 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	