

الجدول رقم 56
الحبوب والطحين

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
- طحن حبوب الدقيق الغذائي والتعبئة واستخدام الطحين.	15 يوما	- التهاب الأنف المتكرر بعد التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت باختبار.
		- الربو أو ضيق التنفس الربوي المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت باختبار وظيفي للجهاز التنفسي.
	سنة واحدة	- عجز تنفسي مزمن انسدادى نتيجة مرض الربو.
	90 يوما	- الالتهاب الرئوي الناتج عن فرط الحساسية غير الليفى المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت بالأشعة المقطعية على الصدر، واختبار وظيفي للجهاز التنفسي و عملية غسل القصبات والأسناخ، والتي يمكن إكمالها بالاستكشافات أو الفحوصات المناعية أو الأدلة النسيجية.
	3 سنوات	- الالتهاب الرئوي الناتج عن فرط الحساسية الليفى المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت بالأشعة المقطعية على الصدر، واختبار وظيفي للجهاز التنفسي و عملية غسل القصبات والأسناخ، والتي يمكن إكمالها بالاستكشافات أو الفحوصات المناعية أو الأدلة النسيجية.
- تحضير واستعمال ومباشرة طحين الحبوب.	7 أيام	- الشرى التماسي المتكرر بعد التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت بواسطة قياس الغلوبولين المناعي من النوع E (IgE) المحددة أو باختبار الوخز المحدد.
	30 يوما	- التهاب الجلد التماسي التحسسي المتكرر إثر التعرض من جديد لطحين الحبوب أو المثبت باختبار جلدي سطحي خاص إيجابي النتيجة للمادة المستعملة.